中3数学D 宿題解答 2学期-3

宿題 3-1

(1) $f(x) = x^3 - 5x^2 - 2x + 24$ とおく.
 定数項 24 の約数を代入していくと
 $f(-2) = -8 - 20 + 4 + 24 = 0$
 なので, $f(x)$ は $x+2$ で割り切れて,
 $f(x) = (x+2)(x^2 - 7x + 12)$
 $= (x+2)(x-3)(x-4)$
 したがって, $f(x) = 0$ の解は
 $x = -2, 3, 4$

(2) $f(x) = x^3 - 4x^2 - 6x + 5$ とおく.
 定数項 5 の約数を代入していくと
 $f(5) = 125 - 100 - 30 + 5 = 0$
 なので, $f(x)$ は $x-5$ で割り切れて,
 $f(x) = (x-5)(x^2 + x - 1)$
 したがって, $f(x) = 0$ の解は
 $x-5 = 0$ または $x^2 + x - 1 = 0$
 を解いて
 $x = 5, \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$

(3) $f(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4$ とおく.
 定数項 4 の約数を代入していくと
 $f(1) = 1 + 2 - 3 - 4 + 4 = 0$
 なので, $f(x)$ は $x-1$ で割り切れて,
 $f(x) = (x-1)(x^3 + 3x^2 - 4)$
 次に, $g(x) = x^3 + 3x^2 - 4$ とおく.
 定数項 -4 の約数を代入していくと
 $f(1) = 1 + 3 - 4 = 0$
 よって, $g(x)$ も $x-1$ で割り切れて,
 $g(x) = (x-1)(x^2 + 4x + 4)$
 $= (x-1)(x+2)^2$
 $\therefore f(x) = (x-1) \times (x-1)(x+2)^2$
 $= (x-1)^2(x+2)^2$
 したがって, $f(x) = 0$ の解は
 $x = 1, -2$

宿題 3-2

点 (x, y) が C と D の交点になるのは, (x, y) が
 連立方程式

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y-2)^2 = 5 & \text{①} \\ y = x^2 & \text{②} \end{cases}$$

の解となるときに他ならない.

②を①に代入して

$$(x-1)^2 + (x^2-2)^2 = 5$$

$$x^4 - 3x^2 - 2x = 0$$

$$x(x^3 - 3x - 2) = 0 \quad \text{③}$$

ここで, $f(x) = x^3 - 3x - 2$ とおくと,

$$f(-1) = -1 + 3 - 2 = 0$$

なので, $f(x)$ は $x+1$ で割り切れて,

$$f(x) = (x+1)(x^2 - x - 2)$$

$$= (x+1)(x+1)(x-2)$$

$$= (x+1)^2(x-2)$$

したがって, ③の解は

$$x(x+1)^2(x-2) = 0 \quad \therefore x = 0, -1, 2.$$

それぞれの場合に, ②で y の値を計算して,
 交点の座標は

$$(0, 0), (-1, 1), (2, 4)$$

※ C と D を図示すると下図のようになって
 おり, C と D は点 $(-1, 1)$ で「接して」い
 る.

宿題 3-3

[方針 A]

C の式を

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

とおくと, A(1,1), B(3,2), C(9,10) を通るので

$$\begin{cases} 1^2 + 1^2 + a + b + c = 0 \\ 3^2 + 2^2 + 3a + 2b + c = 0 \\ 9^2 + 10^2 + 9a + 10b + c = 0 \end{cases}$$

が成り立つ. これを解いて

$$a = 8, b = -27, c = 17$$

よって, $x^2 + y^2 + 8x - 27y + 17 = 0$.

[方針 B]

A, B, C を通る円の中心は, 三角形 ABC の外心であり, 3 辺の垂直二等分線の交点である. AB, BC の垂直二等分線の式を求めると, それぞれ

$$\text{AB の垂直二等分線: } y = -2x + \frac{11}{2}$$

$$\text{BC の垂直二等分線: } y = -\frac{3}{4}x + \frac{21}{2}$$

なので, 交点の座標を計算すると,

$$\left(-4, \frac{27}{2}\right)$$

この点を中心として, A(1,1) を通る円の式が求めるものだから,

$$(x+4)^2 + \left(y - \frac{27}{2}\right)^2 = (1+4)^2 + \left(1 - \frac{27}{2}\right)^2$$

$$\therefore (x+4)^2 + \left(y - \frac{27}{2}\right)^2 = \frac{725}{4}$$

宿題 3-4

a, b の最大公約数を $\text{GCD}(a, b)$ で書く.

$$(1) \text{GCD}(a, b) = \text{GCD}(a - b, b) \text{ を用いて,}$$

$$\text{GCD}(999999, 999999999)$$

$$= \text{GCD}(999999, 999000000)$$

$$= \text{GCD}(999999, 999 \times 1000000)$$

$999999 = 1000000 - 1$ と 1000000 は共通

の素因数をもたないので,

$$= \text{GCD}(999999, 999)$$

$$= \text{GCD}(999 \times 1001, 999)$$

$$= \boxed{999}$$

$$(2) \text{GCD}(a, b) = \text{GCD}(a - b, b) \text{ を用いて,}$$

$$\text{GCD}(10^{21} - 1, 10^{14} - 1)$$

$$= \text{GCD}(10^{21} - 10^{14}, 10^{14} - 1)$$

$$= \text{GCD}((10^7 - 1) \times 10^{14}, 10^{14} - 1)$$

10^{14} と $10^{14} - 1$ は共通の素因数をもたないので,

$$= \text{GCD}(10^7 - 1, 10^{14} - 1)$$

$$= \text{GCD}(10^7 - 1, (10^7 - 1)(10^7 + 1))$$

$$= \boxed{10^7 - 1 (= 9999999)}$$

※ 指数を用いて表しているだけで, (1)と同様の計算をしていることに注意.

$$(3) \text{GCD}(a, b) = \text{GCD}(a - b, b) \text{ を用いて,}$$

$$\text{GCD}(2^{39} - 1, 2^{26} - 1)$$

$$= \text{GCD}(2^{39} - 2^{26}, 2^{26} - 1)$$

$$= \text{GCD}((2^{13} - 1) \times 2^{26}, 2^{26} - 1)$$

2^{26} と $2^{26} - 1$ は共通の素因数をもたないので,

$$= \text{GCD}(2^{13} - 1, 2^{26} - 1)$$

$$= \text{GCD}(2^{13} - 1, (2^{13} - 1)(2^{13} + 1))$$

$$= \boxed{2^{13} - 1 (= 8191)}$$

※ $2^{39} - 1, 2^{26} - 1$ を 2 進法で表せば

$$\underbrace{1111 \dots 1}_{39} \text{ と } \underbrace{1111 \dots 1}_{26}$$

であるので, これもやはり(1)と同じ問題と言える.

宿題 3-5

(1) 三角形 ABC において、余弦定理より

$$\cos B = \frac{5^2 + 7^2 - 8^2}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \boxed{\frac{1}{7}}$$

(2) したがって ($\sin B > 0$ より)

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

であり、

$$\begin{aligned} \angle FBD &= \angle FBA + B + \angle CBD \\ &= 30^\circ + B + 30^\circ = B + 60^\circ \end{aligned}$$

なので、加法定理より

$$\begin{aligned} \cos \angle FBD &= \cos(B + 60^\circ) \\ &= \cos B \cos 60^\circ - \sin B \sin 60^\circ \\ &= \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{2} - \frac{4\sqrt{3}}{7} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{-\frac{11}{14}} \end{aligned}$$

(3) 三角形 FAB は $\angle FAB = \angle FBA = 30^\circ$ の二等辺三角形で、

$$BF = \frac{1}{\sqrt{3}} BA = \frac{5}{\sqrt{3}}$$

三角形 DBC も同様で、

$$BD = \frac{1}{\sqrt{3}} BC = \frac{7}{\sqrt{3}}$$

三角形 FBD で余弦定理より、

$$\begin{aligned} FD^2 &= BF^2 + BD^2 - 2 BF \cdot BD \cos \angle FBD \\ &= \left(\frac{5}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{7}{\sqrt{3}}\right)^2 - 2 \cdot \frac{5}{\sqrt{3}} \cdot \frac{7}{\sqrt{3}} \cdot \left(-\frac{11}{14}\right) \\ &= \frac{74}{3} + \frac{55}{3} = 43 \end{aligned}$$

$$\therefore FD = \boxed{\sqrt{43}} (> 0)$$

(4) 同様にして、DE, EF も計算すると、

DE :

$$\cos C = \frac{7^2 + 8^2 - 5^2}{2 \cdot 7 \cdot 8} = \frac{11}{14}, \sin C = \frac{5\sqrt{3}}{14}$$

$$\cos \angle DCE = \frac{11}{14} \cdot \frac{1}{2} - \frac{5\sqrt{3}}{14} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{7}$$

より、

DE²

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{7}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{8}{\sqrt{3}}\right)^2 - 2 \cdot \frac{7}{\sqrt{3}} \cdot \frac{8}{\sqrt{3}} \cdot \left(-\frac{1}{7}\right) \\ &= \frac{113}{3} + \frac{16}{3} = 43 \end{aligned}$$

$$\therefore DE = \sqrt{43}$$

EF :

$$\cos A = \frac{8^2 + 5^2 - 7^2}{2 \cdot 8 \cdot 5} = \frac{1}{2} \quad \therefore A = 60^\circ$$

$$\cos \angle EAF = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

より、

EF²

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{8}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{5}{\sqrt{3}}\right)^2 - 2 \cdot \frac{8}{\sqrt{3}} \cdot \frac{5}{\sqrt{3}} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{89}{3} + \frac{40}{3} = 43 \end{aligned}$$

$$\therefore EF = \sqrt{43}$$

よって、DE = EF = FD となり、三角形 DEF は正三角形である。

※ 1 学期『三角比と図形』の C6-2, I) にあたる問題です。

※ どのような三角形 ABC に対しても、本問のように正三角形 PBC, QCA, RAB を取り、それらの重心を D, E, F とすると、三角形 DEF は正三角形になることが知られている (ナポレオンの定理)。